

Uvod

Istorijske napomene

Ljekari iz kliničke bolnice u Baltimoreu prvi su započeli KPR u bolničkim uslovima 1960. god. Takođe i prva vanbolnička uspješna reanimacija izvršena je u Baltimoreu.

Američko kardiološko udruženje 1976. god. preporučilo je prvi standard KPR i nakon toga svake četiri godine koristeći nova saznanja o KPR mijenjaju se i postavljaju novi standardi. U nove standarde je 1980. god uveden Heimlichov zahvat, a takođe su utvrđeni novi standardi za oživljavanje djece. Standardi su doživjeli značajne promjene u mnogim postupcima od tada pa do danas. Najnovije izmjene smjernica prema WHO su od 18.10.2010. god.

Poznavanje pružanja mjera osnovne životne potpore je osnova svake reanimacije. BLS kurs Evropskog Reanimacionog savjeta je osmišljen u cilju ovladavanja osnovnim znanjima i vještinama pružanja mjera kardiopulmonalne reanimacije za široki sloj zanimanja, uključujući srednje medicinski kadar, ljekare kao i ostale profesionalne zdravstvene radnike. Kurs traje tri dana ili više dana ukoliko je namijenjen zdravstvenim radnicima i sadrži interaktivna predavanja, demonstracije vještina, video prikaz, ima izrazit akcenat na uvježbavanju manuelnih vještina i praktičnom radu na lutkama – manekenima. Sadržaj kursa baziran je na trenutno važećim Preporukama ERC-a koje se odnose na osnovnu životnu potporu. Uvježbava se primjena protokola sa jednim spasiocem – sprovodiocem kardiopulmonalne reanimacije da bi tokom kursa učesnici u programu kursa namijenjenom za zdravstvene profesionalce uvježbavali rad u timu od dva – tri spasioca uz primjenu odgovarajućih sredstava za obezbeđivanje disajnog puta i ventilaciju.