

O TIPOVIMA DEVOJAKA SA ANTISOCIJALNIM POREMEĆAJIMA PONAŠANJA

Konstantin Momirović, Ankica Hošek, Dobrivoje Radovanović i Danka Radulović
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

ABSTRAKT

Reprezentativan uzorak od 1918 ispitanika ženskog pola, starih 18 godina, opisan je skupom varijabli izvedenih iz mernih instrumenata za procenu osobina ličnosti, efikasnosti procesa socijalizacije, intelektualnih sposobnosti i manifetnog aberantnog ponašanja. Iz ovog uzorka izabran je, tehnikom višestrukog sečenja, subuzorak od 282 devojke koje su imale nadprosečne rezultate u testovima psihastenične disocijacije, regresivne disocijacije, psihopatske agresivnosti i histerične agrsivnosti, dakle u merama poremećaja socijalizacije i iznad prosečan broj manifestnih simptoma aberantnog ponašanja. Ovaj subuzorak tretiran je kao subuzorak devojaka sa antisocijalnim poremećajima ličnosti, dakle kao subuzorak psihopata ženskog pola. Ispitanice iz tog subuzorka, opisane svim primenjenim varijablama, klasifikovane su zatim taksonomskom neuronskom mrežom Explorer sa ciljem da se pronađu psihološki tipovi mladih devojaka sa psihopatskim sklopom ličnosti. Ova je mreža otkrila, sa koeficijentom efikasnosti od 0.989, tri tipa veoma dobro definisana raznim profilima kognitivnih i konativnih poremećaja. Prvi tip je bio definisan blagim poremećajima konativnih funkcija uz očuvane funkcije kognitivnih procesora, ali sa nadprosečnim intenzitetom aberantnog ponašanja. Drugi tip je bio definisan ispod prosečnom efikasnošću svih kognitivnih procesora i teškim poremećajima svih konativnih regulatora uz nadprosečni intenzitet aberantnog ponašanja. Treći tip je bio definisan ozbiljnim poremećajima regulacije aktiviteta, visokom bazičnom i psihopatskom agresivnošću i veoma intenzivnim aberantnim ponašanjem, ali uz nadprosečnu efikasnost paralelnog procesora, dakle profilom koji je karakterističan za za mlade psihopate muškog pola.

Ključne reči: psihopati / taksonomska analiza / neuronske mreže